

Aufklärung Kieferorthopädische Behandlung

Während der Behandlungszeit gibt es ein paar Dinge, die man wissen oder beachten sollte.



Tragezeit

Werden die Behandlungsmittel zu wenig getragen, kann das Behandlungsziel nicht erreicht werden. Die erforderliche Tragezeit liegt zwischen 12 bis 22 Stunden pro Tag.



Mundhygiene

Unter oder um die Teile der Zahnspange sammeln sich vermehrt Essensreste an. Diese müssen nach jedem Essen entfernt werden. Schlechte Mundhygiene oder häufiger Zuckerkonsum (auch Fruchtsäfte, Energydrinks, gesüßte Tees) können Flecken oder Karies an den Zähnen und Entzündungen des Zahnfleischs verursachen.



Kontrollen

Regelmäßige Kontrollen sind für die erfolgreiche Behandlung unbedingt erforderlich.



Komplikationen

Es können Druckstellen auftreten und Zähne können empfindlich sein. Fehlerhafte Funktion der Muskulatur kann begleitende myofunktionelle Therapie (Logopädie) und Physiotherapie erforderlich machen.

Individuelle Risiken





Diagnostik

Im Verlauf der Behandlung sind in größeren Abständen Zwischenuntersuchungen erforderlich. Diese umfassen Abformungen, Röntgenbilder und Fotos o.ä.



Verlauf

Bei mangelnder Reaktion muss die Therapie angepasst werden. Die Behandlung erfolgt nach allgemein anerkanntem Standard. Der Erfolg ist nicht geschuldet.



Ästhetik

Je nach Zahnform und Zustand des Zahnfleisches können Restlücken bestehen bleiben.



Rezidiv

Zähne können sich nach Abschluss der Behandlung weiterhin bewegen. Geeignete Gegenmaßnahmen erläutern wir bei der Behandlung.



Mitarbeit

Ohne ausreichende Mitwirkung des Patienten kann das Behandlungsziel nicht erreicht werden. Die Vorgaben des Behandlers sind unbedingt umzusetzen. Bei wiederholten Unregelmäßigkeiten bleibt der Abbruch der Behandlung vorbehalten.

Zustimmung zur kieferorthopädischen Behandlung

Ich habe die Aufklärung gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit und Gelegenheit für Rückfragen und willige in die Behandlung ein:

Leverkusen, den		X	
	Datum		Unterschrift Patient/-in / gesetzlicher Vertreter